

## BCG Che cosa è

Il BCG è il **bacillo di Calmette-Guerin**: scoperto nel 1921 come vaccino per la tubercolosi, la sua efficacia nella terapia del **tumore alla vescica** è stata dimostrata da numerosi studi scientifici. Viene somministrato attraverso un **catetere vescicale**: il BCG provoca una desquamazione delle cellule malate della vescica, che vengono eliminate con l'urina. Inoltre il BCG **stimola le difese immunitarie**.

La terapia inizia non prima di 20 giorni dall'intervento.

Prevede **quattro sedute** ambulatoriali, una a settimana.

Dopo circa 90 giorni dall'ultima somministrazione, viene eseguito un **esame di controllo** (*cistoscopia*). Se il trattamento è stato efficace, è previsto un **ciclo di mantenimento**, una volta al mese. In caso contrario, il medico comunica la successiva terapia.

## SE COMPAIONO DISTURBI...


Dopo la terapia possono comparire alcuni disturbi, anche per diversi giorni: **maggior frequenza, urgenza e bruciori nell'urinare**.

Puoi notare la **presenza di sangue o frammenti** di tessuto nelle urine. Puoi avere **malesseri** (tipo influenza), **febbricola** per qualche giorno o **febbre elevata** (38°/39°) con **brividi** nelle prime 24 ore. Di solito la febbre si risolve prendendo del paracetamolo; se questi disturbi continuano o si aggravano **contatta il Servizio di Endoscopia urologica**.

PER QUALSIASI PROBLEMA  
CONTATTA:

**Servizio di Endoscopia urologica**  
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16  
Tel.: 0524 515642/1


Negli altri giorni e orari:  
**Unità operativa di Urologia**  
Tel.: 0524 515279



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## Chemioterapia endovescicale

# BCG



## Informazioni per i pazienti

## PRIMA della terapia

- La **sera prima** della terapia assumi l'antibiotico se prescritto dal medico
- Nelle **4 ore prima non mangiare o bere** alimenti o bevande contenenti **caffaina** (caffè, the, cioccolato, alcolici) perché possono irritare la vescica
- Nelle **2 ore** prima del trattamento, **non bere per non riempire la vescica**
- **Subito prima** del trattamento, devi **urinare**

Febbraio 2019

Opuscolo realizzato dall'U.O. di Urologia dell'Ospedale di Vaio in collaborazione con:

**H**health **L**iteracy

Gruppi aziendali per la semplificazione e la chiarezza della comunicazione ai cittadini  
Azienda Usl-Azienda Ospedaliera di Parma

## DURANTE la terapia

- Un infermiere, dopo averti fatto stendere sul lettino, inserisce il **catetere** e inietta il farmaco. **Non sentirai dolore**
- Terminata l'instillazione, il catetere viene tolto e l'infermiere ti comunica quando puoi tornare a casa
- Affinchè il farmaco agisca e venga a contatto con tutta la vescica, **per circa un'ora** dalla terapia, ti raccomandiamo di **non urinare e di cambiare posizione ogni 15 minuti**: in piedi, disteso a pancia in su e a pancia in giù, sul fianco destro e sinistro

### Avvertenze

Dopo circa un'ora, puoi urinare.

Quando vai in bagno, è consigliato sedersi sulla toilette, per evitare di schizzare urina.

Dopo aver urinato, presta particolare attenzione a **lavare accuratamente le mani e i genitali** per evitare l'irritazione della cute che il farmaco può provocare.

## DOPO la terapia

- Dopo **2 ore** dalla terapia **bevi molta acqua** (la quantità di acqua da bere viene comunicata dall'infermiere in base alle tue condizioni cliniche) durante la giornata, per pulire la vescica dai residui del farmaco
- Nei **2 giorni** successivi alla terapia prendi l'antibiotico prescritto dal medico
- **Non affaticarti** per le prime **24 ore**
- Nelle giornate successive puoi condurre una **vita normale**. Per esempio puoi andare in bicicletta, fare passeggiate, andare a ballare, esporti al sole, riprendere l'attività lavorativa
- **Durante la settimana successiva al trattamento, se hai rapporti sessuali utilizza il preservativo**

