


Informa salute

Notizie dall'Azienda Usl di Parma



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

ZANZARA TIGRE E ALTRI INSETTI: PERICOLI PUBBLICI

PREVENIRE LA DIFFUSIONE
PROTEGGERSI DALLE PUNTURE
CONSIGLI PER CHI VIAGGIA

Per non prendere le malattie - anche gravi - trasmesse da zanzare e pappataci è necessario contrastarne la proliferazione e proteggersi dalle punture. Anche in viaggio, è utile seguire alcuni semplici accorgimenti.

COME PREVENIRE LA DIFFUSIONE

1. Evitare i ristagni d'acqua

Un sottovaso, un tombino, un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara. Perciò è importante rimuovere tutti gli oggetti che possono contenerla anche solo occasionalmente.



2. Usare prodotti larvicidi

Se non è possibile evitare ristagni di acqua (come nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) si deve ricorrere ai prodotti larvicidi, a cadenza periodica, da aprile a novembre, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.



Per info: chiamare il numero verde **800.033.033** il proprio comune di residenza oppure consultare il sito www.zanzaratigreonline.it



COME PROTEGGERSI DALLE PUNTURE

1. Abbigliamento corretto

Vestirsi sempre di colori chiari, indossare pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe e non utilizzare profumi.

2. Usare repellenti

Soprattutto se si sta all'aperto, è consigliato applicare prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo, seguendo dosi e modalità riportate nelle istruzioni. In casa, è bene utilizzare zanzariere, condizionatori e apparecchi elettromagnetici di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte.



VIRUS E PARASSITI, I PAESI A RISCHIO

1. WEST NILE VIRUS (zanzara comune)

Sono state segnalate epidemie in Paesi dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente e recentemente anche in Europa (Serbia, Grecia, Ungheria, Romania, Russia, ecc.) e negli Stati Uniti.

2. CHIKUNGUNYA (zanzara tigre)

È presente in Africa, nel sud est asiatico, nel subcontinente indiano, nell'area dell'oceano Indiano; dalla fine del 2013, in diverse isole caraibiche dove è tuttora in atto un importante evento epidemico.

3. DENGUE (zanzara tigre)

È endemica in almeno 100 Paesi di quattro continenti: Asia, America, Africa e Oceania.

4. LEISHMANIOSI (pappatacio)

Il 90% delle forme viscerali si registra in India, Bangladesh, Nepal, Sudan, Etiopia e Brasile. Il 90% di quelle cutanee in Afghanistan, Algeria, Iran, Arabia Saudita, Siria, Brasile, Colombia, Perù e Bolivia.

Prima di partire, rivolgersi per tempo agli ambulatori viaggi internazionali dell'Azienda USL di Parma. **In viaggio**, seguire i consigli a fianco riportati.

Al rientro, in caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se accompagnata da dolori articolari, si raccomanda di segnalare al proprio medico o alla struttura ospedaliera a cui ci si è rivolti, i Paesi visitati.

