

PROVA N. 1

- 1) **Qual è il migliore trattamento di una incontinenza urinaria da instabilità del detrusore?**
 - A. Colporrafia anteriore
 - B. Intervento a fionda
 - C. Farmacoterapia
 - D. Tutte le altre risposte
 - E. Riabilitazione ginnica del pavimento pelvico

- 2) **Quale ormone stimola la maturazione del follicolo ovario?**
 - A. FSH
 - B. LH
 - C. Estrogeni
 - D. Progesterone
 - E. Testosterone

- 3) **Quale dei seguenti tumori maligni più frequentemente metastatizza alla placenta e al feto?**
 - A. Leucemia
 - B. Melanoma
 - C. Carcinoma mammario
 - D. Carcinoma della cervice
 - E. Carcinoma uterino

- 4) **Quale delle seguenti formazioni anatomiche prende origine dal dotto di Wolff nella donna:**
 - A. Tube uterine
 - B. Tubuli seminiferi
 - C. Canale vaginale
 - D. Dotto deferente
 - E. A contatto con ovocita

- 5) **La maturazione degli spermatozoi avviene a livello:**
 - A. Epididimo
 - B. Tubuli seminiferi
 - C. Canale vaginale
 - D. Dotto deferente
 - E. A contatto con l'ovocita

- 6) **L'incidenza delle cardiopatie congenite nei bambini nati vivi è di circa:**
 - A. 1%
 - B. 10%
 - C. 15%

- 7) **la causa più frequente di dispareunia profonda è:**
 - A. la sindrome di Master Allen
 - B. la malattia infiammatoria pelvica (PID)
 - C. l'endometriosi
 - D. il varicocele
 - E. la Sindrome da Intrappolamento dei Nervi Addominali (ACNES)

- 8) **la responsabilità penale è:**
 - A. di tutta l'equipe assistenziale
 - B. strettamente personale ed individuale
 - C. sempre del capo equipe
 - D. sempre del medico

- 9) **Il rivolgimento per manovre esterne si esegue:**
 - A. Nelle situazioni trasverse
 - B. Nelle situazioni oblique
 - C. Sul feto in presentazione alla 35^a settimana
 - D. Tutte le sopraindicate

- 10) **In che percentuale si verifica un sanguinamento occulto nel distacco di placenta:**
 - A. nel 10%
 - B. nel 15%
 - C. nel 20%

- 11) **Le decelerazioni precoci sono generalmente secondarie a:**
- A. Ipotensione materna
 - B. Compressione della testa fetale
 - C. Ridotta ossigenazione fetale
 - D. Compressione del funicolo
- 12) **Le reazioni di ipersensibilità di primo tipo sono dovute a:**
- A. IgG
 - B. Ig M
 - C. IgG IgM
 - D. IgE
 - E. IgD
- 13) **L'arteria uterina nasce:**
- A. dall'arteria ovarica
 - B. dall'arteria ipogastrica
 - C. dall'arteria renale
 - D. dall'aorta addominale
- 14) **Lo studio del rapporto lecitine/Sfingomieline nel liquido amniotico è utile per:**
- A. La diagnosi della sofferenza fetale
 - B. La diagnosi di malformazione fetali
 - C. La diagnosi di maturità polmonare fetale
 - D. In tutti i citati casi
 - E. In nessuno dei citati casi
- 15) **Dal punto di vista topografico, la placenta previa si dice laterale quando:**
- A. Il suo bordo è situato a meno di 3 cm dall'orificio uterino interno
 - B. Il suo bordo dista più di 3 cm dall'o.u.i
 - C. Si trova lateralmente al feto
 - D. Nessuna delle precedenti
- 16) **Cause precipitanti dell'embolia di liquido amniotico sono:**
- A. Travaglio prolungato
 - B. Anomalie pelviche
 - C. Anemia megaloplastica
 - D. Travaglio precipitoso
 - E. Nessuna delle precedenti
- 17) **Quali farmaci sono utilizzati nella minaccia di parto prematuro?**
- A. Beta-bloccanti
 - B. Beta stimolanti
 - C. Metildopa
 - D. Nessuno di questi
- 18) **La trombosi venosa profonda NON riconosce tra i fattori di rischio.**
- A. L'uso degli anticoncezionali
 - B. L'obesità
 - C. Gli interventi chirurgici
 - D. L'ipertensione arteriosa
 - E. L'immobilità
- 19) **Una ipofibrinogenemia può verificarsi per:**
- A. Distacco intempestivo di placenta
 - B. Ritenzione uterina di feto morto
 - C. Embolia di liquido amniotico
 - D. Tutte le sopraindicate
- 20) **Una primigravida di 18 anni si trova alla 26° settimana di gestazione. Una cultura della cervice è positiva per Chlamydia trachomatis. Quale dei seguenti antibiotici sarebbe il più appropriato per questa paziente?**
- A. Dicloxacillina
 - B. Ampicillina
 - C. Cefuroxamide
 - D. Vancomicina
 - E. Eritromicina

PROVA N. 2

- 1) **La stima del rischio per esposizione percutanea a sangue infetto dell'HIV è:**
 - A. Tra lo 0,2%-0,5%
 - B. Del 5%
 - C. Del 20%

- 2) **Nel neonato a termine l'Hb fetale costituisce in percentuale rispetto all'Hb totale il:**
 - A. 50%
 - B. 100%
 - C. 80%

- 3) **La trombina è l'enzima che.**
 - A. Attiva il fibrinogeno
 - B. Scioglie il reticolo di fibrina
 - C. Attiva il plasminogeno
 - D. avvia la sintesi della vitamina k

- 4) **Lo sviluppo del clitoride e delle grandi labbra vaginali si deve all'azione.**
 - A. Estrogeni
 - B. Progesterone
 - C. Androgeni
 - D. Gonadotropine
 - E. Nessuna delle citate

- 5) **Quali farmaci sono utilizzati nella minaccia di parto prematuro?**
 - A. Beta-bloccanti
 - B. Beta-stimolanti
 - C. Ossitocici
 - D. Metildopa
 - E. Nessuno di questi

- 6) **La palatoschisi è una patologia congenita che colpisce un neonato su....nati vivi:**
 - A. 100
 - B. 300
 - C. 800
 - D. 1500

- 7) **Una diatesi emorragica materna in caso di morte intrauterina fetale è dovuta a:**
 - A. Deficit di vitamina C
 - B. Deficit di vitamina K
 - C. Ipocalcemia
 - D. Ipofibrinogenemia
 - E. Tutte le citate

- 8) **La manovra di Leopold permette di stabilire:**
 - A. Se il feto è in posizione longitudinale, trasversa o obliqua
 - B. A che livello è salito il fondo dell'utero
 - C. Se la parte presentata è impegnata
 - D. Quali sono le caratteristiche della parte presentata
 - E. Se il canale cervicale ha iniziato a dilatarsi

- 9) **Nella pre-eclampsia la più frequente lesione epatica è:**
 - A. Degenerazione grassa con necrosi centrobulbare
 - B. Necrosi periportale
 - C. Emorragie epatiche e depositi di fibrina
 - D. Emorragie sottocapsulari
 - E. Nessuna delle citate

- 10) **Quale dei seguenti muscoli non fa parte del perineo?**
 - A. Trasverso superficiale
 - B. Trasverso profondo
 - C. Piramidale
 - D. Ischio-cavernoso
 - E. Bulbo spongioso

- 11) **Quale dei seguenti vaccini iniettabili è controindicato in gravidanza?**
- A. Tetano
 - B. Poliomielite
 - C. Parotite
 - D. Influenza
 - E. Rabbia
- 12) **Da quale anomalo corredo cromosomico è caratterizzato la sindrome di Klinefelter:**
- A. XO trisomia 15
 - B. Delezione del braccio corto del cromosoma 18
 - C. XXY
 - D. YY
- 13) **Il rischio di avulsione del muscolo elevatore dell'ano nel primo parto è di circa:**
- A. 1-5%
 - B. 15-30%
 - C. 50-70%
 - D. 90%
- 14) **La causa più comune di incontinenza urinaria in una posizione in menopausa è:**
- A. Incontinenza urinaria da stress
 - B. Presenza di diverticoli uretrali
 - C. Incontinenza da accumulo di urina
 - D. Vescica instabile
 - E. Fistola vescico-vaginale
- 15) **La localizzazione più frequente dell'endometriosi è:**
- A. Superficie peritoneale dell'intestino tenue
 - B. Omento
 - C. Appendice
 - D. Vescica
 - E. Peritoneo del cavo del Douglas
- 16) **L'eclampsia è caratterizzata da:**
- A. Cefalea lieve e transitoria
 - B. Iperriflessia
 - C. Convulsioni tipo grande male
 - D. Convulsioni tipo piccolo male
 - E. Scotomi
- 17) **Lo sviluppo dell'apparato genitale femminile avviene a carico dei:**
- A. Dotti di Gartner
 - B. Dotti di Muller
 - C. Dotti di Wolff
- 18) **La responsabilità penale è :**
- A. Di tutta l'equipe assistenziale
 - B. Strettamente personale ed individuale
 - C. Sempre del capo equipe
 - D. Sempre del medico
- 19) **L'analgesia peridurale:**
- A. Aumenta il tasso dei cesarei
 - B. Modifica i tempi di travaglio di parto
 - C. Diminuisce l'indice di Apgar dei neonati
 - D. Aumenta l'indice di Apgar nei neonati
- 20) **Il rivolgimento per manovre esterne si esegue:**
- A. Nelle situazioni trasverse
 - B. Nelle situazioni oblique
 - C. Sul feto in presentazione podalica alla 35^a settimana
 - D. Tutte le sopraindicate

PROVA N. 3

- 1) **La settimana gestazionale nella quale il feto raggiunge la maturità polmonare è la:**
 - A. 30[^]
 - B. 28[^]
 - C. 32[^]
 - D. 34[^]

- 2) **In che percentuale si verifica un sanguinamento occulto nel distacco di placenta:**
 - A. nel 10%
 - B. nel 15%
 - C. nel 20%

- 3) **Il tempo indicativo per la trasfusione di una sacca di piastrine (80cc) è di circa:**
 - A. 10 minuti
 - B. 30 minuti
 - C. 60 minuti
 - D. 90 minuti

- 4) **Lo sviluppo dell'apparato genitale femminile avviene a carico dei:**
 - A. Dotti di Gartner
 - B. Dotti di Muller
 - C. Dotti di Wolff

- 5) **Le immunoglobuline più abbondanti nel latte umano sono:**
 - A. IgG
 - B. IgA
 - C. IgM
 - D. IgE

- 6) **In condizioni fisiologiche il ph del sangue fetale varia fra.**
 - A. 7,50 e 7,46
 - B. 7,45 e 7,41
 - C. 7,40 e 7,25
 - D. 7,24 e 7,20
 - E. 7,19 e 7,10

- 7) **L'adenomiosi è:**
 - A. Un tumore ovarico
 - B. Un tipo di fibroma uterino
 - C. Presenza di ghiandole nei muscoli perineali
 - D. Endometriosi ovarica
 - E. Presenza di endometrio nello spessore del miometrio

- 8) **Le ossa parietali sono unite all'osso occipitale attraverso la sutura:**
 - A. Frontale
 - B. Lambdoidea
 - C. Temporale
 - D. Sagittale
 - E. Biparietale

- 9) **Nella patogenesi della pre-eclampsia ha importanza:**
 - A. L'invasione trofoblastica
 - B. La produzione di prostaciclina-tromboxano
 - C. Il danno endoteliale
 - D. Tutte le citate
 - E. Nessuna delle citate

- 10) **Il glucosio è presente nelle urine:**
 - A. Sempre
 - B. Quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl
 - C. Quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 250 mg/dl
 - D. Solo in casi di patologie renali
 - E. mai

- 11) La penicillina agisce:**
- A. Bloccando il trasporto di membrana
 - B. Danneggiando il DNA
 - C. Bloccando i ribosomi
- 12) La secrezione di prolattina è stimolata da uno dei seguenti fattori:**
- A. Dopamina
 - B. Somatostatina
 - C. Cortisolo
 - D. Estrogeni
- 13) Nella gravidanza fisiologica l'uricemia materna:**
- A. È diminuita
 - B. È aumentata
 - C. Rimane invariata
- 14) Vi è una maggiore incidenza di mola vescicolare nelle donne di età:**
- A. Superiore ai 20 anni
 - B. Inferiore ai 20 anni
 - C. Compresa tra i 20-40 anni
 - D. Superiore a 45 anni
 - E. Inferiore a 20 e superiore ai 45 anni
- 15) L'incidenza delle cardiopatie congenite nei bambini vivi è di circa:**
- A. 1%
 - B. 10%
 - C. 15%
- 16) La produzione placentare degli estrogeni avviene nel:**
- A. Sinciziotrofoblasta
 - B. Citotrofoblasta
 - C. entrambi
- 17) La causa più frequente di perdite ematiche vaginali in una neonata è:**
- A. Traumatismi da parto
 - B. Sospensione estrogenica
 - C. Allergia ai pannolini
 - D. Anomalie anatomiche vaginali
 - E. Cervico-carcinoma congenito
- 18) Lo sviluppo del clitoride e delle grandi labbra vaginali si deve all'azione.**
- A. Estrogeni
 - B. Progesterone
 - C. Androgeni
 - D. Gonadotropine
 - E. Nessuna delle citate
- 19) La palatoschisi è una patologia congenita che colpisce un neonato su....nati vivi:**
- A. 100
 - B. 300
 - C. 800
 - D. 1500
- 20) Per intervento di Schauta si intende:**
- A. Isterectomia addominale radicale allargata
 - B. Colpoisterectomia radicale
 - C. Isteropessi
 - D. Intervento per prolasso uterino
 - E. Intervento di plastica tubarica