

## LA PRESTAZIONE

Questa prenotazione prevede **ESCLUSIVAMENTE LA VALUTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTI MPOX.**

## COSA E' LA VACCINAZIONE E A COSA SERVE

È la pratica medica con la quale si inietta un prodotto (vaccino) costituito da microrganismi vivi attenuati, inattivati o parti di essi o da sostanze prodotte da questi (tossine) inattivate.

Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più efficaci a disposizione della Sanità Pubblica, grazie alle quali è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che possono causare importanti complicanze, sequele invalidanti e morte; la persona vaccinata, nel caso venga a contatto con il microrganismo ha più probabilità di non ammalarsi o di non avere complicanze.

## INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE

LA VACCINAZIONE ANTI MPOX E' GRATUITA e RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A CATEGORIE DI SOGGETTI A RISCHIO PREVISTE DALLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI, CONSULTABILI ALLA PAGINA DEDICATA A MPOX DEL SITO INTERNET REGIONALE.

**LA PRESTAZIONE NON SARA' OFFERTA AGLI UTENTI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE A RISCHIO.**

## IL VACCINO CONTRO MPOX

In base alle indicazioni Ministeriali, il vaccino utilizzato è un vaccino per la prevenzione del Vaiolo e di Mpox, che viene somministrato agli individui di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino contiene una forma attenuata (indebolita) del virus vaccinico vivo Ankara modificato, non replicante, che appartiene alla stessa famiglia del virus del vaiolo; il vaccino non è in grado di diffondersi o di causare l'infezione e la malattia.

Il Vaccino contro Mpox prevede una schedula vaccinale differenziata in base alle precedenti vaccinazioni ricevute:

- Sono previste due dosi a distanza di almeno 28 giorni l'una dall'altra nei soggetti che nell'arco della vita non hanno MAI ricevuto un vaccino contro il vaiolo.
- È indicata un'unica dose di richiamo nei soggetti che sono stati già vaccinati contro il vaiolo in passato. I soggetti con sistema immunitario indebolito ricevono due dosi a distanza di almeno 28 giorni l'una dall'altra; al momento non è previsto un tempo limite per la somministrazione della seconda dose.

## QUALI SONO GLI EVENTI INDESIDERATI DELLA VACCINAZIONE (RISCHI)

Come tutti i farmaci anche i vaccini possono causare effetti indesiderati, ma questi sono, nella maggior parte dei casi, di lieve entità e transitori, consistendo per lo più in reazione infiammatorie nel punto di inoculazione (dolore, rossore e gonfiore) e a volte febbre: tali effetti collaterali possono essere agevolmente trattati.

Eventi avversi più seri (ad esempio reazioni allergiche gravi, sindromi neurologiche, etc...) si manifestano solo molto raramente (un caso ogni migliaia o milioni di dosi somministrate). Alcuni eventi segnalati in associazione con le vaccinazioni sono così rari che è impossibile valutare la dimensione del rischio e provare l'esistenza di un effettivo rapporto di causalità con queste.

Gli effetti indesiderati più comuni del vaccino contro Mpox (che possono riguardare più di 1 persona su 10) sono cefalea, nausea, dolore muscolare, stanchezza e reazioni in sede di iniezione (dolore, arrossamento, tumefazione, indurimento e sensazione di prurito). Il vaccino non deve essere usato in pazienti che sono ipersensibili (allergici) al principio attivo o a una qualsiasi delle sostanze presenti in tracce, come proteine di pollo, benzonasi e gentamicina.

## L'ATTO VACCINALE

La prestazione prevede:

- la valutazione della raccolta anamnestica, compilata dall'utente, per l'eventuale valutazione di stati patologici o di terapie in atto che possono controindicare o far rimandare la vaccinazione,
- l'acquisizione del consenso informato,
- la somministrazione del vaccino con iniezione sottocutanea solitamente effettuata sul braccio,
- rilascio del certificato vaccinale (scaricabile anche da Fascicolo Sanitario Elettronico),
- attesa di 15 minuti dopo la vaccinazione, presso la sala d'aspetto dell'ambulatorio; in caso di gravi forme allergiche il personale medico potrebbe prolungare il tempo di osservazione post-vaccinale o posticipare le vaccinazioni in altra data e in ambiente protetto.

## SI RICORDA INFINE...

- di portare con sé, se disponibile, il cartellino/certificato delle vaccinazioni, un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria,
- di presentarsi con documentazione clinica relativa ad eventuali patologie allergiche, croniche e/o di altra natura e con l'elenco dei farmaci eventualmente assunti,
- di segnalare l'eventuale stato di gravidanza,
- **CHE QUESTA PRESTAZIONE VACCINALE VERRA' FORNITA ESCLUSIVAMENTE AGLI UTENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI RISCHIO DI CUI SI FA RIFERIMENTO SUL SITO REGIONALE,**
- DI RIVOLGERSI, IN CASO DI EFFETTI AVVERSI POST-VACCINALI, AL MEDICO CURANTE E/O AL CENTRO VACCINALE IN CUI HA RICEVUTO LA PRESTAZIONE.

## PRESTAZIONI CORRELATE

Le persone che richiedono tale prestazione e pensano di essere esposti ad ulteriori rischi quali le infezioni sessualmente trasmesse posso rivolgersi agli ambulatori regionali IST/PrEP.

Per le sedi orari e modalità di prenotazione presso tali centri può consultare il sito di Help AIDS collegandosi al seguente link:

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni>

<https://www.helpaids.it/PrEP>

<https://www.helpaids.it/monkeypox>