

Uffici di Staff Direzione Generale
Uffici stampa e comunicazione

Parma, 8/4/2018

Comunicato stampa

Segnalato un caso di tubercolosi a Langhirano (Pr): al via la profilassi tra famigliari e contatti più stretti

E' un bambino di 12 anni che frequenta le scuole medie, in buone condizioni e ricoverato al Maggiore a Parma. Avviati i test tra la cerchia di persone più stretta

È stato segnalato a Langhirano un **caso positivo alla tubercolosi, in una forma a bassa contagiosità**. Si tratta di un **bambino di 12 anni**, che si trova **in buone condizioni** e ricoverato al reparto infettivi della Pediatria generale all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

I professionisti del Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl di Parma hanno tempestivamente **attivato tutte le misure di prevenzione e sorveglianza previste**, iniziando quindi a contattare tutte le persone della cerchia più stretta del ragazzo. Oltre alla famiglia, è stata contattata la scuola (Istituto comprensivo di Langhirano) frequentata dal giovane studente **per invitare compagni e insegnanti della classe a sottoporsi, in via precauzionale, al test della tubercolina con piccola iniezione sottocutanea** (Mantoux) nonostante la bassa contagiosità del caso. I test verranno eseguiti presso gli ambulatori della Casa della Salute di Langhirano, in via Roma 42/1. I professionisti del Dipartimento di sanità pubblica e della

[Digitare il testo]

Pediatria di comunità dell'Azienda Usl si sono messi a disposizione delle famiglie e della Direzione della scuola per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

CHE COSA E' LA TUBERCOLOSI E COME SI CURA

La **tubercolosi** è una **malattia infettiva e contagiosa causata da un batterio**, il *Mycobacterium tuberculosis*. Il contagio può avvenire per trasmissione da un individuo malato, tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. La tubercolosi attacca solitamente i polmoni, ma può colpire anche altre parti del corpo. Una diagnosi precoce consente di adottare gli opportuni interventi terapeutici e di ottenere la guarigione. **L'esame preliminare più diffuso**, per diagnosticare una forma tubercolare, **è il test della tubercolina (Mantoux)**. La reazione positiva a questo test indica che il sistema immunitario è già venuto a contatto con il batterio della tubercolosi. **Se la tubercolina è positiva**, bisogna accertare o escludere una malattia attiva soprattutto nei polmoni e a tale fine si esegue una radiografia del torace. Spetta al medico decidere la terapia più idonea sulla base degli esami e della storia clinica del paziente. Il trattamento con **farmaci antitubercolari**, una volta iniziato, va seguito scrupolosamente e va accompagnato da esami di controllo (FONTE: Ministero della Salute).

Uffici stampa
Aziende sanitarie di Parma

[Digitare il testo]