

1. L'intervallo minimo tra la somministrazione di vaccino antipneumococcico 13 valente e 23 valente è
 - a. 3 mesi
 - b. 8 settimane
 - c. 6 mesi
 - d. almeno 5 anni
2. Secondo il calendario vaccinale (2017/19) al 4° mese di vita quale richiamo è previsto?
 - a. nessun richiamo
 - b. 2° dose vaccino contro il rotavirus e 2° dose del meningococco B
 - c. 2° dose vaccino meningococco B
 - d. 3° dose meningococco B
3. Le vaccinazioni sono una misura di prevenzione
 - a. primaria
 - b. secondaria
 - c. terziaria
 - d. assoluta
4. La prevalenza è definita
 - a. il rapporto fra nuovi casi di malattia in un dato intervallo di tempo ed il totale della popolazione a rischio di contrarre quella malattia
 - b. la proporzione di un gruppo di soggetti inizialmente sani, che sviluppano una malattia in un determinato intervallo di tempo
 - c. il rapporto fra tutti i casi di malattia presenti in un dato momento ed il totale della popolazione in quel dato momento
 - d. la somma dei casi di malattia presenti in un periodo preciso e i nuovi casi insorti in quel determinato momento
5. La linea guida è
 - a. una descrizione circostanziata della sequenza delle azioni che un operatore sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale
 - b. un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica
 - c. un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti
 - d. uno schema di sequenza comportamentali orientate ad un obiettivo
6. Cosa significa "isolamento"
 - a. separazione, per il periodo di contagiosità, dalle persone (o animali) infette, dagli altri, in ambiente e condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta o indiretta dell'agente infettivo
 - b. allontanamento del paziente da tutte le comunità estranee allo stretto ambito domiciliare
 - c. si applica in caso di agenti altamente infettivi o molto virulenti che possono essere trasmessi per via aerea o per contatto diretto
 - d. da applicare in caso di infezioni molto virulenti, trasmissibili per contatto diretto o semidiretto.
7. Per audit clinico, nell'ambito dei sistemi di qualità, si intende
 - a. la programmazione delle attività di consulenza e di controllo da parte di un oggetto esterno ai fini della certificazione di una struttura sanitaria
 - b. una forma di verifica basata sulla revisione tra pari, nella quale gli operatori confrontano processi e attività con standard predefiniti e condivisi
 - c. la discussione di un caso clinico a scopo didattico, anche in forma interdisciplinare
 - d. un'attività di coinvolgimento degli utenti e delle loro associazioni nella definizione dei livelli essenziali di assistenza
8. Le immunoglobuline somministrate in corso di profilassi antitetanica rappresentano una forma di immunoprofilassi
 - a. naturale-attiva
 - b. naturale-passiva
 - c. artificiale-attiva
 - d. artificiale-passiva
9. La profilassi vaccinale post-esposizione è indicata nel caso di esposizione recente a
 - a. morbillo
 - b. epatite B
 - c. tetano
 - d. tutte le precedenti
10. Il morbillo si trasmette
 - a. con le spore di clostridium tetani attraverso ferite anche di modesta estensione
 - b. per contagio interumano attraverso l'aria tramite goccioline di saliva espulse parlando o tossendo o attraverso alimenti
 - c. trasmissione oro-fecale
 - d. per via aerea
11. Il vaccino antipneumococcico 13 valente è costituito da
 - a. componenti polisaccaridiche
 - b. anafossine
 - c. virus vivo attenuato
 - d. virus vivo intero ucciso
12. In epidemiologia gli studi di coorte
 - a. sono gli studi analitici di tipo retrospettivo
 - b. sono gli studi analitici che mettono a confronto gruppi di soggetti variamente esposti nel tempo a fattori di rischio
 - c. sono degli studi descrittivi delle malattie presente in una determinata popolazione
 - d. sono degli studi clinici sperimentali
13. Secondo il D.M. 15 dicembre 1990, che sancisce l'obbligo di notifica da parte del medico, le malattie infettive sono suddivise in cinque classi, per ogni classe è poi prevista la definizione di specifiche procedure. Quale malattia rientra nella classe 1?
 - a. scarlattina
 - b. tetano
 - c. meningite
 - d. morbillo
14. Per profilassi si intende il complesso delle misure utili a
 - a. prevenire la comparsa e la diffusione della malattia
 - b. diminuire le modalità di trasmissione dei patogeni
 - c. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di carattere tumorale
 - d. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di cui ci si può vaccinare
15. Quali fra queste malattie infettive è soggetta a notifica entro 12 ore
 - a. giardiasi
 - b. malaria
 - c. scarlattina
 - d. meningite batterica
16. Con il termine epidemia si intende
 - a. la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in una certa area e in breve periodo di tempo
 - b. la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino
 - c. la casuale comparsa di una malattia in un individuo
 - d. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio

Applicare qui
il Codice a Barre
coprendo questa scritta



17. **Il tasso di incidenza in una popolazione**
- e' una misura epidemiologica istantanea
 - considera il numero di nuovi casi in un intervallo di tempo
 - si utilizza per le malattie cronico-degenerative
 - si utilizza per le malattie infettive
18. **Quando si parla di vaccini combinati**
- quando nella stessa seduta vengono somministrati più vaccini in sede diversa senza che questi siano miscelati
 - non esistono vaccini combinati
 - diversi vaccini vengono somministrati insieme, in un'unica sospensione
 - vaccini somministrati direttamente per via mucosale
19. **Il vaccino contro la febbre gialla è costituito da**
- microorganismo vivo e attenuato
 - anattossina
 - componenti antigeniche
 - microorganismo intero ucciso
20. **Si definisce autoimmune**
- la reazione ad un vaccino
 - una patologia determinata dallo sviluppo, da parte del soggetto, di anticorpi anomali che agiscono contro il proprio organismo
 - una patologia per la quale il soggetto sviluppa autonomamente un sistema di difesa efficace, senza bisogno di immunostimolatori
 - nessuna delle risposte è corretta
21. **Il soggetto ammalato di una malattia infettiva che elimina l'agente patogeno è considerato**
- portatore sano
 - portatore convalescente
 - veicolo
 - nessuna delle precedenti risposte
22. **Che cos'è l'adiuvante**
- un vaccino
 - un antigene
 - una sostanza che aumenta la risposta immunitaria
 - nessuna delle precedenti
23. **Lo staphylococcus aureus può causare una grave intossicazione alimentare che è il risultato dell'azione di una**
- enterotossina
 - emolisina
 - leucocidina
 - coagulasi
24. **Cos'è l'intradermo reazione di Mantoux**
- è un test di verifica di malattia in atto
 - test di elezione per lo screening dell'infezione tubercolare
 - test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - è un test di verifica di avvenuta guarigione
25. **L'evidence-based Medicine è**
- una branca specialistica della medicina
 - un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta da medici
 - un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
 - un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca
26. **Cosa si intende quando si parla di herd immunity (immunità di gregge)**
- e' l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati
 - e' l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria
 - e' l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono dal contatto delle persone vaccinate
 - e' l'immunità congenita che acquisisce il nascituro se la mamma si vaccina
27. **Le vaccinazioni raccomandate in gravidanza previste dal Ministero della Salute**
- difterite-tetano-pertosse, influenza
 - difterite-tetano
 - difterite-pertosse, polio e influenza
 - solo influenza
28. **Di cosa si occupa la sorveglianza PASSI**
- inchieste epidemiologiche
 - effettuare un monitoraggio a 360 gradi sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
 - vaccinazioni
 - effettuare un monitoraggio sull'attività fisica della popolazione italiana
29. **Qual è il serbatoio principale dell'infezione da legionella?**
- bovini
 - uomo
 - ambiente
 - gatto
30. **La prevenzione terziaria consiste**
- nella riduzione del rischio di contrarre la malattia
 - nell'identificazione precoce dei segni o sintomi di malattia
 - nell'applicazione di tecniche volte a ridurre la gravità o le complicanze di una malattia
 - nell'evitare effetti di pratiche mediche non necessarie

Conc. Assistente Sanitario AVEN 24/06/21 - Scritto
Compito B

1. Il vaccino contro la febbre gialla è costituito da
 - a. microorganismo vivo e attenuato
 - b. anatossina
 - c. componenti antigeniche
 - d. microorganismo intero ucciso
2. Lo *staphylococcus aureus* può causare una grave intossicazione alimentare che è il risultato dell'azione di una
 - a. enterotossina
 - b. emolisina
 - c. leucocidina
 - d. coagulasi
3. La prevalenza è definita
 - a. il rapporto fra nuovi casi di malattia in un dato intervallo di tempo ed il totale della popolazione a rischio di contrarre quella malattia
 - b. la proporzione di un gruppo di soggetti inizialmente sani, che sviluppano una malattia in un determinato intervallo di tempo
 - c. il rapporto fra tutti i casi di malattia presenti in un dato momento ed il totale della popolazione in quel dato momento
 - d. la somma dei casi di malattia presenti in un periodo preciso e i nuovi casi insorti in quel determinato momento
4. Cos'è l'intradermo reazione di Mantoux
 - a. è un test di verifica di malattia in atto
 - b. test di elezione per lo screening dell'infezione tubercolare
 - c. test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - d. è un test di verifica di avvenuta guarigione
5. L'individuo che ospita in modo stabile un microorganismo, pur non sviluppando la malattia è
 - a. un portatore sano
 - b. un portatore convalescente
 - c. un portatore malato
 - d. un portatore cronico
6. Quando si parla di vaccini combinati
 - a. quando nella stessa seduta vengono somministrati più vaccini in sede diversa senza che questi siano mescolati
 - b. non esistono vaccini combinati
 - c. diversi vaccini vengono somministrati insieme, in un'unica sospensione
 - d. vaccini somministrati direttamente per via mucosale
7. Che cos'è l'adiuvante
 - a. un vaccino
 - b. un antigene
 - c. una sostanza che aumenta la risposta immunitaria
 - d. nessuna delle precedenti
8. La profilassi vaccinale post-esposizione è indicata in caso di esposizione recente a
 - a. morbillo
 - b. epatite B
 - c. tetano
 - d. tutte le precedenti
9. La via di trasmissione dell'HIV
 - a. via ematica, via materno-fetale e via sessuale
 - b. via ematica
 - c. via sessuale
 - d. via materno fetale e via ematica
10. Il vaccino antipneumococcico 13 valente è costituito da
 - a. componenti polisaccaridiche
 - b. anatossine
 - c. virus vivo attenuato
 - d. virus vivo intero ucciso
11. Le vaccinazioni raccomandate in gravidanza previste dal Ministero della Salute
 - a. difterite-tetano-pertosse, influenza
 - b. difterite-tetano
 - c. difterite-pertosse, polio e influenza
 - d. solo influenza
12. Il morbillo si trasmette
 - a. con le spore di clostridium tetani attraverso ferite anche di modesta estensione
 - b. per contagio interumano attraverso l'aria tramite goccioline di salive espulse parlando o tossendo o attraverso alimenti
 - c. trasmissione oro-fecale
 - d. per via aerea
13. Il vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) è costituito da
 - a. componenti polisaccaridiche
 - b. anatossine
 - c. virus intero uccisi
 - d. virus vivo e attenuato
14. Cosa si intende quando si parla di herd immunity (immunità di gregge)
 - a. e' l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati
 - b. e' l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria
 - c. e' l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono dal contatto delle persone vaccinate
 - d. e' l'immunità congenita che acquisisce il nascituro se la mamma si vaccina
15. La prevenzione terziaria consiste
 - a. nella riduzione del rischio di contrarre la malattia
 - b. nell'identificazione precoce dei segni o sintomi di malattia
 - c. nell'applicazione di tecniche volte a ridurre la gravità o le complicanze di una malattia
 - d. nell'evitare effetti di pratiche mediche non necessarie
16. Per profilassi si intende il complesso delle misure utili a
 - a. prevenire la comparsa e la diffusione della malattia
 - b. diminuire le modalità di trasmissione dei patogeni
 - c. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di carattere tumorale
 - d. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di cui ci si può vaccinare
17. Per audit clinico, nell'ambito dei sistemi di qualità, si intende
 - a. la programmazione delle attività di consulenza e di controllo da parte di un oggetto esterno ai fini della certificazione di una struttura sanitaria
 - b. una forma di verifica basata sulla revisione tra pari, nella quale gli operatori confrontano processi e attività con standard predefiniti e condivisi
 - c. la discussione di un caso clinico a scopo didattico, anche in forma interdisciplinare
 - d. un'attività di coinvolgimento degli utenti e delle loro associazioni nella definizione dei livelli essenziali di assistenza
18. L'intervallo minimo tra la somministrazione di vaccino antipneumococcico 13 valente e 23 valente è
 - a. 3 mesi
 - b. 8 settimane
 - c. 6 mesi
 - d. almeno 5 anni
19. Il tasso di incidenza in una popolazione
 - a. e' una misura epidemiologica istantanea
 - b. considera il numero di nuovi casi in un intervallo di tempo
 - c. si utilizza per le malattie cronico-degenerative
 - d. si utilizza per le malattie infettive

Applicare qui
il Codice a Barre
coprendo questa scritta



20. L'evidence-based Medicine è
- una branca specialistica della medicina
 - un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta da medici
 - un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
 - un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca
21. Il ciclo di base per il vaccino antitetanico è costituito da
- 3 dosi
 - 1 dose
 - 2 dosi
 - 4 dosi
22. La linea guida è
- una descrizione circostanziata della sequenza delle azioni che un operatore sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale
 - un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica
 - un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti
 - uno schema di sequenza comportamentali orientate ad un obiettivo
23. Le immunoglobuline somministrate in corso di profilassi antitetanica rappresentano una forma di immunoprofilassi
- naturale-attiva
 - naturale-passiva
 - artificiale-attiva
 - artificiale-passiva
24. Gli anticorpi responsabili delle reazioni allergiche sono
- IgA
 - IgM
 - IgE
 - IgB
25. In epidemiologia gli studi di coorte
- sono gli studi analitici di tipo retrospettivo
 - sono gli studi analitici che mettono a confronto gruppi di soggetti variamente esposti nel tempo a fattori di rischio
 - sono degli studi descrittivi delle malattie presenti in una determinata popolazione
 - sono degli studi clinici sperimentali
26. Qual è il serbatoio principale dell'infezione da legionella?
- bovini
 - uomo
 - ambiente
 - gatto
27. Cosa significa "isolamento"
- separazione, per il periodo di contagiosità, dalle persone (o animali) infette, dagli altri, in ambiente e condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta o indiretta dell'agente infettivo
 - allontanamento del paziente da tutte le comunità estranee allo stretto ambito domiciliare
 - si applica in caso di agenti altamente infettivi o molto virulenti che possono essere trasmessi per via aerea per contatto diretto
 - da applicare in caso di infezioni molto virulenti, trasmissibili per contatto diretto o semidiretto.
28. Quali fra queste malattie infettive è soggetta a notifica entro 12 ore
- giardiasi
 - malaria
 - scarlattina
 - meningite batterica
29. Le vaccinazioni sono una misura di prevenzione
- primaria
 - secondaria
 - terziaria
 - assoluta
30. Di cosa si occupa la sorveglianza PASSI
- inchieste epidemiologiche
 - effettuare un monitoraggio a 360 gradi sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
 - vaccinazioni
 - effettuare un monitoraggio sull'attività fisica della popolazione italiana

1. **Cos'è l'intradermo reazione di Mantoux**
 - a. è un test di verifica di malattia in atto
 - b. test di elezione per lo screening dell'infezione tubercolare
 - c. test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - d. è un test di verifica di avvenuta guarigione
2. **La prevalenza è definita**
 - a. il rapporto fra nuovi casi di malattia in un dato intervallo di tempo ed il totale della popolazione a rischio di contrarre quella malattia
 - b. la proporzione di un gruppo di soggetti inizialmente sani, che sviluppano una malattia in un determinato intervallo di tempo
 - c. il rapporto fra tutti i casi di malattia presenti in un dato momento ed il totale della popolazione in quel dato momento
 - d. la somma dei casi di malattia presenti in un periodo preciso e i nuovi casi insorti in quel determinato momento
3. **Le immunoglobuline somministrate in corso di profilassi antitetanica rappresentano una forma di immunoprofilassi**
 - a. naturale-attiva
 - b. naturale-passiva
 - c. artificiale-attiva
 - d. artificiale-passiva
4. **L'essere vivente che consente la perpetuazione e diffusione di un agente patogeno è considerato.**
 - a. vettore
 - b. veicolo
 - c. serbatoio di infezione
 - d. mezzo di trasmissione
5. **La profilassi vaccinale post-esposizione è indicata in caso di esposizione recente a**
 - a. morbillo
 - b. epatite B
 - c. tetano
 - d. tutte le precedenti
6. **Il vaccino antipneumococcico 13 valente è costituito da**
 - a. componenti polisaccaridiche
 - b. anatossine
 - c. virus vivo attenuato
 - d. virus vivo intero ucciso
7. **Per profilassi si intende il complesso delle misure utili a**
 - a. prevenire la comparsa e la diffusione della malattia
 - b. diminuire le modalità di trasmissione dei patogeni
 - c. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di carattere tumorale
 - d. prevenire la comparsa e la diffusione solo delle malattie di cui ci si può vaccinare
8. **Per audit clinico, nell'ambito dei sistemi di qualità, si intende**
 - a. la programmazione delle attività di consulenza e di controllo da parte di un oggetto esterno ai fini della certificazione di una struttura sanitaria
 - b. una forma di verifica basata sulla revisione tra pari, nella quale gli operatori confrontano processi e attività con standard predefiniti e condivisi
 - c. la discussione di un caso clinico a scopo didattico, anche in forma interdisciplinare
 - d. un'attività di coinvolgimento degli utenti e delle loro associazioni nella definizione dei livelli essenziali di assistenza
9. **Quali tra le seguenti non segue la catena di trasmissione oro-fecale?**
 - a. epatite virale A
 - b. colera
 - c. botulismo
 - d. infezioni tifo-paratifiche
10. **Qual è il serbatoio principale dall'infezione da legionella**
 - a. bovini
 - b. uomo
 - c. ambiente
 - d. gatto
11. **Che cos'è l'adiuvante**
 - a. un vaccino
 - b. un antigene
 - c. una sostanza che aumenta la risposta immunitaria
 - d. nessuna delle precedenti
12. **Cosa si intende quando si parla di herd immunity (immunità di gregge)**
 - a. è l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati
 - b. è l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria
 - c. è l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono dal contatto delle persone vaccinate
 - d. è l'immunità congenita che acquisisce il nascituro se la mamma si vaccina
13. **Il tasso di incidenza in una popolazione**
 - a. è una misura epidemiologica istantanea
 - b. considera il numero di nuovi casi in un intervallo di tempo
 - c. si utilizza per le malattie cronico-degenerative
 - d. si utilizza per le malattie infettive
14. **Quali sono in Italia le vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati previste dal PNPV 2017 - 2019**
 - a. antipolio, antitetanica, antidifterica, antiepatite B, antipolio
 - b. antimorbillo, antipolio, antitetanica, antidifterica, antiepatite B antipertossica
 - c. antipolio, antitetanica, antidifterica, antipertossica, antiepatite B, antiaemophilus B, antimorbillo, antiparotite, antirosolia
 - d. antipolio, antitetanica, antidifterica, antipertossica, antiepatite B, antiaemophilus B, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antivaricella
15. **In epidemiologia gli studi di coorte**
 - a. sono gli studi analitici di tipo retrospettivo
 - b. sono gli studi analitici che mettono a confronto gruppi di soggetti variamente esposti nel tempo a fattori di rischio
 - c. sono degli studi descrittivi delle malattie presente in una determinata popolazione
 - d. sono degli studi clinici sperimentali
16. **I provvedimenti previsti dalla Circolare ministeriale n° 4 del 13 marzo 1998, per i contatti con età inferiore a 7 anni, in un caso di pertosse sono**
 - a. somministrazione, a prescindere dallo stato vaccinale, di eritromicina
 - b. solo l'isolamento domiciliare
 - c. solo un richiamo di antidiftero-tetano-pertosse
 - d. nessun provvedimento perché già vaccinati
17. **Quale dei seguenti vaccini è costituito da virus inattivati**
 - a. antinfluenzale
 - b. antiparotite
 - c. antifebbre gialla
 - d. anticolerico
18. **Il morbillo si trasmette**
 - a. con le spore di clostridium tetani attraverso ferite anche di modesta estensione
 - b. per contagio interumano attraverso l'aria tramite goccioline di salive espulse parlando o tossendo o attraverso alimenti
 - c. trasmissione oro-fecale
 - d. per via aerea

Applicare qui
il Codice a Barre
coprendo questa scritta



Conc. Assistente Sanitario AVEN 24/06/21 - Scritto
Compito C

19. La prevenzione terziaria consiste
- nella riduzione del rischio di contrarre la malattia
 - nell'identificazione precoce dei segni o sintomi di malattia
 - nell'applicazione di tecniche volte a ridurre la gravità o le complicanze di una malattia
 - nell'evitare effetti di pratiche mediche non necessarie
20. L'intervallo minimo tra la somministrazione di vaccino antipneumococcico 13 valente e 23 valente è
- 3 mesi
 - 8 settimane
 - 6 mesi
 - almeno 5 anni
21. L'evidence-based Medicine è
- una branca specialistica della medicina
 - un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta da medici
 - un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
 - un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca
22. Di cosa si occupa la sorveglianza PASSI
- inchieste epidemiologiche
 - effettuare un monitoraggio a 360 gradi sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
 - vaccinazioni
 - effettuare un monitoraggio sull'attività fisica della popolazione italiana
23. La linea guida è
- una descrizione circostanziata della sequenza delle azioni che un operatore sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale
 - un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica
 - un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti
 - uno schema di sequenza comportamentali orientate ad un obiettivo
24. Le vaccinazioni sono una misura di prevenzione
- primaria
 - secondaria
 - terziaria
 - assoluta
25. Quali fra queste malattie infettive è soggetta a notifica entro 12 ore
- giardiasi
 - malaria
 - scarlattina
 - meningite batterica
26. Il vaccino contro la febbre gialla è costituito da
- microorganismo vivo e attenuato
 - anattossina
 - componenti antigeniche
 - microorganismo intero ucciso
27. Lo staphylococcus aureus può causare una grave intossicazione alimentare che è il risultato dell'azione di una
- enterotossina
 - emolisina
 - leucocidina
 - coagulasi
28. Cosa significa "isolamento"
- separazione, per il periodo di contagiosità, dalle persone (o animali) infette, dagli altri, in ambiente e condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta o indiretta dell'agente infettivo
 - allontanamento del paziente da tutte le comunità estranee allo stretto ambito domiciliare
 - si applica in caso di agenti altamente infettivi o molto virulenti che possono essere trasmessi per via aerea per contatto diretto
 - da applicare in caso di infezioni molto virulenti, trasmissibili per contatto diretto o semidiretto.
29. Quando si parla di vaccini combinati
- quando nella stessa seduta vengono somministrati più vaccini in sede diversa senza che questi siano mescolati
 - non esistono vaccini combinati
 - diversi vaccini vengono somministrati insieme, in un'unica sospensione
 - vaccini somministrati direttamente per via mucosale
30. Le vaccinazioni raccomandate in gravidanza previste dal Ministero della Salute
- difterite-tetano-pertosse, influenza
 - difterite-tetano
 - difterite-pertosse, polio e influenza
 - solo influenza